

Los tic habituales en el Síndrome de Tourette *

<i>Tipo de tic:</i>	<i>Motor</i>	<i>Vocal/Fónico</i>
Simple	Parpadeo de ojos Giros de ojos Encogimiento de hombros Estiramiento del cuello Penarse o retirarse el pelo de los ojos Abrir la boca Extender el brazo Muecas faciales Retorcer la nariz Lamerse los labios Ponerse bizco/mirar de reojo	Aclararse la garganta Gruñir Chillar Sorber por la nariz Ladrar Resoplar Toser Escupir Chillar (como un ratón) Tararear Silbar Graznar Reir
Complejo	Tirarse de la ropa Tocar a otras personas Tocar objetos Olerse los dedos Oler objetos Saltar o saltar a la pata coja Meter el dedo o dar codazos Dar puñetazos Dar patadas Botar Besarse o besar a otras personas Agitar los brazos Dar vueltas en redondo Tensar grupos musculares Retorcimientos de ingles o torso Retorcer el pelo Andar de puntillas Copropraxia: Tocarse sexualmente Tocar sexualmente a otras personas Gestos obscenos Fenómenos de eco: Acciones de otras personas Las propias acciones Conductas autolesivas (ej., Morderse, Golpearse, Tirarse de la piel o arrancarse las costras)	Hacer sonidos de animales Cambios de tono o volumen de voz Tartamudear Fenómenos de eco: Sonicos o palabras propias Sonidos o palabras de otras personas Coprolalia: Obscenidades Frasas socialmente prohibidas
Interno	Tic de respiración Tic de la vejiga Tic intestinal	

**Nota: En esta relación no figuran todos los tic posibles. Además, cualquier conducta o síntoma puede tener explicaciones alternativas in niños con ST y otros diagnósticos como Trastorno Obsesivo-Compulsivo y/o Trastorno de Déficit de Atención con Hiperactividad. El diagnóstico diferencial de cualquier otro síntoma no puede realizarse sin un estudio o información adicional. Los profesores y miembros del equipo escolar deberán ponerse en contacto con los padres del niño afectado y con los profesionales que le estén tratando para recabar indicaciones y ayuda.*